

periodos de riesgo

bajo medio alto

desinfección de suelo

trasplante/plantación

semana de cultivo


























programa ICM en pepinos

(trasplante o siembra ciclo de otoño)

variedades: **Strategos** (1/1 al 15/3 y del 15/8 al 15/9), **Kantaka** (1/9 al 15/10)

Triunfal (15/9 al 15/10), **Tridente** (1/10 al 15/11)

enfermedad	SEPTIEMBRE			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			FEBRERO				MARZO					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
 <p>Mildiu <i>Pseudoperonospora</i></p>	Favorecer la ventilación			(Realizar una o dos aplicaciones por producto según riesgo)																								
																												
 <p>Didimella <i>Didymella brioniae</i></p>																												
 <p>Podredumbres aéreas <i>Botrytis/Sclerotinia</i></p>	Favorecer la ventilación																											
																												
								(Máximo 3 aplicaciones espaciadas 10 días como mínimo)																				
 <p>Oídios <i>Sphaerotheca/Erysiphe</i></p>																												
																												

ATL Umbral de tratamiento

↓ Momento de tratamiento

© Syngenta Bioline 2012

Nota importante: Los datos contenidos en esta Información pretenden servir de información básica y general. Algunos de los datos citados en este documento podrían variar, por ello, en todo momento deben seguirse rigurosamente las recomendaciones de uso indicadas en las etiquetas de los productos.



programa ICM en pepinos (trasplante o siembra ciclo de otoño)



variedades: **Strategos** (1/1 al 15/3 y del 15/8 al 15/9), **Kantaka** (1/9 al 15/10), **Triunfal** (15/9 al 15/10), **Tridente** (1/10 al 15/11)

limpieza de estructura	trasplante	periodos de riesgo																						
		bajo			medio			alto																
semana de cultivo	SEPTIEMBRE			OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			auxiliares			
plaga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23
Mosaica blanca <i>Bemisia</i>	Actara® Bandeja			Actara® Via riego				Plenum® / Piriproxifen ATL				Azatin® ATL			Plenum® ATL			Azatin® ATL						
Trips <i>Frankliniella</i>	Match®			AmblyLine cu				ThripLine ams				AmblyLine cu			ThripLine ams									
Minador <i>Liriomyza spp.</i>	Vertimec®			Digline _i				Trigard® ATL																
Pulgón <i>Aphis gossypii</i>	Actara®			Plenum®				Aphiline _C																
Orugas <i>Spodoptera/Plusia</i>	Affirm			Delfin® / Costar®											Delfin® / Costar® ATL									
Araña Roja <i>Tetranychus spp.</i>	Vertimec®			PhytoLine p														Zeldox® ATL						

ATL Umbral de tratamiento

↓ Momento de tratamiento

↓ Momento de suelta

S: Suelta

ind: Individuos

© Syngenta Bioline 2012